



ORD. : 390-17

ANT. :

MAT. : CAMPAÑA DE VACUNACION
2017

CONCEPCION, marzo 20 de 2017

DE. : DIRECTOR CENTRO DE SALUD O'HIGGINS
SR. ALBERTO NÚÑEZ BARRERA

A COLEGIO CHARLES DE GAULLE
COLD COLD SA - CONCEPCION

De mi consideración:

Junto con saludar, informo a Ud. que a contar del 15 de Marzo y hasta el 12 de Mayo de 2017 se procederá a vacunar contra la gripe o influenza a todos los niños de **6 meses a 5 años 11 meses 29 días** en salas cunas, jardines infantiles y establecimientos educacionales del sector. Cabe destacar que aquellos niños que nunca fueron vacunados con influenza en años anteriores o que nacieron los años 2015 y 2016 y estuvieron inasistentes a la segunda dosis de vacuna influenza, deberán recibir una segunda dosis a los 30 días.

Durante la estrategia se utilizará:

- Vacuna "Influvac" de Laboratorio Abbott y
- Vacuna "Vaxigrip del Laboratorio Sanofi Pasteur.

Vacunas cuyas **Contraindicaciones** son:

- Historia de Guillain Barre, asociado a dosis previas de vacuna Influenza.
- Reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna en dosis previas
- Reacciones alérgicas severas al huevo comprobada.
- Alergia a Gentamicina.
-

Reacciones asociadas a la vacuna influenza:

Podría presentar alguno de los siguientes síntomas durante las primeras 48 hrs. después de la vacuna.

- Cefalea (dolor de cabeza), sudoración, mialgia (dolor muscular), artralgia(dolor articular), Fiebre, Malestar, Escalofríos, Fatiga.

Reacción local:

- Enrojecimiento, edema, dolor, induración en el sitio de la inyección.

En caso de presentar estos signos y síntomas se recomienda colocar paños de agua fría en el sitio de la inyección y líquido a tomar.