



La Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza cada año la recomendación de las cepas virales que deben ser incluidas en las vacunas contra la influenza para las temporadas de influenza del hemisferio norte y sur.

La OMS recomienda que las vacunas trivalentes para uso en la temporada de influenza del hemisferio sur del año 2018 contengan las siguientes cepas:

- un virus tipo A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09
- un virus tipo A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)
- un virus tipo B / Phuket / 3073/2013

Los niños que hayan sido vacunados el año 2017 con dos dosis recibirán dosis única este año. Todos los niños que reciban por primera vez vacuna antiinfluenza se deberá administrar dos dosis separadas por 30 días cada una, la inmunidad se obtiene dentro 2 a 3 semanas.

#### **Cuidados después de la vacunación:**

Si el niño presenta fiebre de 38° o más, aplicar paños de agua tibia en la axila, frente y pies y vestirlo con ropa fresca.

Si el médico o pediatra le sugirió tomar analgésicos, no olvides seguir su recomendación.

Si presenta enrojecimiento, endurecimiento e inflamación en el sitio de la aplicación, coloca paños de agua fría de 10 a 15 minutos quitando y colocando. Evita hacer masajes.

Saluda cordialmente,

**MÓNICA AMARO ROMERO**  
**ENFERMERA**  
**CENTRO DE SALUD FAMILIAR O'HIGGINS**

