

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza cada año la recomendación de las cepas virales que deben ser incluidas en las vacunas contra la influenza para las temporadas de influenza del hemisferio norte y sur.

La OMS recomienda que las vacunas trivalentes para uso en la temporada de influenza del hemisferio sur del año 2019 contengan las siguientes cepas:

- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;
- A/Switzerland/8060/2017 (H3N2)-like virus; and
- B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage).

El esquema de Vacunación es el siguiente:

-Niños de 6 meses a 35 meses: 0,25 ml

-Niños de 36 meses y más: 0,5 ml

-Los niños que no tienen antecedentes de vacunación completa previa requerirán una segunda dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas respecto a la primera dosis.

Los posibles efectos después de la vacuna corresponden a: cefalea, sudoración, mialgia, artralgia, fiebre, malestar general, escalofríos, fatiga y reacciones locales: enrojecimiento, edema, dolor, equimosis e induración.

¿Quiénes no debiesen vacunarse?:

Aquellos menores que presenten alergia a los componentes de la vacuna, entre los cuales se encuentran: trazas de huevo (ovoalbúmina), La inmunización deberá ser postergada en niños con fiebre o infección aguda.

En ausencia de notificación u otra indicación por escrito, se asumirá que no existen contraindicaciones ni otros impedimentos para administrar la vacuna, por lo cual se procederá a vacunar a los alumnos.

¿Cuándo se vacunará?

El día ____ de _____ del presente año se concurrirá a la realización de la vacunación que va dirigida a la población de niños.

¿Dónde se vacunará?

En el Colegio _____

¿Qué establecimiento es el responsable de la vacunación?

Cesfam O'Higgins

